A V E R T I S S E M E N T S A G R I C O L E S

DLP 2-4-79092298
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

 ABONNEMENT ANNUEL: 60 F
Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 8 - 29 mars 1979

BULLETIN N° 3

DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

COLZA - Charançons de la tige et Méligèthes -

Les charançons de la tige ne sont plus à craindre : les colzas ont dépassé le stade sensible.

Par contre, les méligèthes ont fait leur apparition et leur nombre, dans certaines situations comme Revel, Saint-Paulet, Bram (Ouest), impose de traiter dès que la présence d'un de ces ravageurs est constatée en moyenne par pied.

Les dégâts de ces insectes étant particulièrement graves à ce stade végétatif (boutons floraux accolés à boutons floraux écartés), il importe de surveiller les cultures au cours de deux à trois visites hebdomadaires.

Si cela s'avère ou devient nécessaire, le traitement peut être effectué avec un oléoparathion à raison de 0,200 kilogramme de matière active à l'hectare (Pacol 4,5 à 4 litres 500 à l'hectare; Oléobladan à 2 litres 200 à l'hectare), dans 200 à 250 litres d'eau à l'hectare, jusqu'à l'apparition des premières pétales jaunes à l'extrémité du bouton floral.

En cas de floraison précoce, avoir le souci de n'utiliser qu'une spécialité à base de dialiphos : non dangereuse pour les abeilles, à raison de 0,600 kilogrammes de matière active à l'hectare (Torak 1,25 litre à l'hectare).

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE,

CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUDE

Tirage du 29 mars 1979 1100 exemplaires N° d'inscription P.P. 531 A.D. 7306